

USO DE
PART
1





Aplicaremos el producto todo el ciclo.
Se utilizará una mayor dosis en la etapa
vegetativa, y una menor dosis en la
etapa de floración.

USO DE
PART
2





Comenzaremos con dosis de 1ml por lt.
Aumentaremos la misma al avanzar el
ciclo, hasta comenzar con el producto
de floración.

Dosis Máxima

- Dosis inicial: 1 ml por litro.
- Aumentar gradualmente la dosis a medida que la planta crece, observando siempre su reacción.
- Dosis máxima:
- En aguas de ósmosis: hasta 5 ml por litro.
- En agua de pozo o ciertas aguas de red: hasta 2,5 ml por litro.

USO DE
PART
3



PART A



Comenzar a aplicar **10 a 15 días antes** del inicio de la floración y continuar **hasta la mitad** del ciclo de floración.

PART B



Al llegar a la mitad de la floración, suspender la **Parte A** y comenzar con la **Parte B**, manteniéndola **hasta el final** del ciclo.

USO DE
PART
4





Aplicaremos este producto en todo el ciclo, en conjunto tanto con el pack de vegetativo como el de floración.

Comenzaremos con la dosis inicial de 1ml por lt, y aumentaremos la misma al avanzar el ciclo observando la reacción del cultivo.